

Actaea racemosa 'Brunette'



Norsk navn: Haustormedrue 'Brunette'

Latinsk navn: Actaea racemosa 'Brunette'

Plantegruppe: NS 4405 Stauder

Type:

Høyde: 2 m

Blomsterfarge: Kvit

Bladverk: Lilla

Våre erfaringer:

(Synonym: Cimicifuga simplex 'Brunette') Veldig mørkt bladverk. Duftende, hvite blomster på sensommer/høsten. Bør stå solrikt for å rekke fram med blomstringen i vårt klima. Humusrik god jord men ikke for vått. Hardfør og vindsterk. Det mørke bladverket gir flott kontrast og gjør seg godt i større plantninger mellom løvfellende eller vintergrønne busker og stauder. Tiltrekker seg mye sommerfugler og bier fra begynnende blomstring og utover høsten. For at planten skal utvikle den best mulige fargen i bladverket er den avhengig av sol hele eller deler av dagen. Ved for mye skygge vil fargen gå over i en mer brunlig-grønn farge. Sorten 'Atropurpurea' har samme hardførhet og egenskaper som 'Brunette' og er også mørkbladet men oppnår ikke i like stor grad

den jevnt mørke brunrøde fargen. I de seinere år er synonymet Actea brukt i litteraturen, i stedet for Cimicifuga.

Blomstringstid:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun
Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des

Hardførhet:

H1	H2	H3	H4	H5	H6
H7	H8				

Høstfarger: Lysforhold:

Ja	Nei	Sol	Delvis Skygge	Skygge
----	-----	-----	---------------	--------

Beskjæringstidspunkt:

Vår	Høst	Vinter	Sommer
-----	------	--------	--------

Vekstforhold:

Tåler	Dårlig	Middels	Godt
Tunge jordarter			
Tørr sandjord			
Kalkholdig jord			
Sur jord			
Fuktig vokseplass			
Vind			
Salt			